

Informatie betreffende volledige haaruitval t.g.v. behandeling met cytostatica

Bij sommige cytostatica behandelingen zal het haar zodanig uitvallen, dat kaalheid het gevolg is. De arts en/of de verpleegkundige zal u hierover informeren. Deze haaruitval begint ongeveer 3 tot 6 weken na de eerste toediening van de cytostatica. Soms wordt de haaruitval vooraf gegaan door gevoeligheid en een pijnlijke hoofdhuid, de zgn. haarpijn. Tijdens het uitvallen van het haar kan de hoofdhuid jeuken. Indien u kiest voor het aanschaffen van een pruik kunt u op de afdeling of op de cytostatica polikliniek een lijst krijgen met adressen van de ANKO Haarwerk Specialisten. U kunt hiervoor ook kijken op www.anko.nl Het is goed om met de zaak van uw keuze een afspraak te maken, zodat men daar op u rekent en ook de tijd voor u kan nemen. Het is prettig iemand mee te nemen die samen met u kijkt of het model staat. Mocht u niet in staat zijn zelf de zaak te bezoeken, dan kan de haarwerksspecialist ook bij u in het ziekenhuis of zelfs bij u thuis komen. Bij de keuze van een pruik is het belangrijk dat u enkele modellen kunt passen om te zien hoe het model u staat. Ga uit van uw eigen haarkleur of een tint lichter. Donkere tinten kunnen het gezicht smaller en bleker maken.

Opmerking: na een behandeling met cytostatica groeit het haar altijd aan! Het is aan te bevelen om tijdens de cytostaticakuur uw hoofdhuid dagelijks in te smeren met een verzorgende crème. Was uw hoofdhuid 1x per week met een verzorgende shampoo. Vraag uw ANKO Haarwerk Specialist om advies.